

DITHANE DG Neotec

Kontaktní fungicid ve formě dispergovatelných mikrogranulí se širokým spektrem účinku proti houbovým chorobám polních plodin, ovocných dřevin, vinné révy, zeleniny a okrasných kultur

Oblast použití

Borovice - Sypavky - 20 g / 10 l vody - Postřik - květen, červen, červenec, srpen

Poznámka: Max. 4x.

Rajčata - Čerň rajčatová - 20 g / 6 l vody - Postřik - červenec, srpen, září

Poznámka: OL=3. Aplikujte podle potřeby v 7 - 14 denních intervalech.

Brukvovitá zelenina - Alternariová skvrnitost - 20 g / 6 l / 100 m² - Postřik - květen, červen

Poznámka: Semenné porosty. První postřik před květem, druhý postřik po odkvětu.

Brukvovitá zelenina - Černá hniloba - 20 g / 6 l / 100 m² - Postřik - květen, červen

Poznámka: Semenné porosty. První postřik před květem, druhý postřik po odkvětu.

Brukvovitá zelenina - Plíseň zelná - 20 g / 6 l / 100 m² - Postřik - červen, červenec

Poznámka: Semenné porosty. První postřik před květem, druhý postřik po odkvětu.

Cibule - Plíseň cibulová - 20 g / 6 l / 100 m² - Postřik - červen, červenec

Poznámka: OL=28. Aplikujte podle infekčního tlaku. Od stádia biče v 7 - 14 denních intervalech.

Dřeviny - Rzi - 20 g / 10 l vody - Postřik - květen, červen, červenec

Poznámka: Ošetřovat opakovaně dle potřeby, max 4x.

Jádroviny - Strupovitost - 20 g / 10 l vody - Postřik - květen, červen

Poznámka: OL=28. Aplikujte před květem, po odkvětu a další ošetření podle potřeby v 10 - 14 denních intervalech.

Karafiáty - Rez karafiátová - 20 g / 6 l vody - Postřik - červen, červenec

Poznámka: Aplikujte preventivně, nejpozději při příznacích choroby.

Mečíky - Houbové choroby - 20 g / 6 l vody - Postřik - červen, červenec

Poznámka: Aplikujte preventivně, nejpozději při příznacích choroby, především v závěru vegetace. Opakujte max. 4 x.

Okrasné dřeviny - Merie modřínová - 20 g / 10 l vody - Postřik - květen, červen, červenec

Poznámka: Pouze modřín. Max. 4x.

Okrasné rostliny - Skvrnitost listů - 20 g / 6 l vody - Postřik - květen, červen, červenec, srpen

Poznámka: Aplikujte preventivně podle potřeby. Aplikujte podle potřeby v 7 - 14 denních intervalech. Max. 4 x.

Pór - Plíseň cibulová - 20 g / 6 l / 100 m² - Postřik - červen, červenec

Poznámka: OL=42. Aplikujte podle infekčního tlaku. Od stádia biče v 7 - 14 denních intervalech.

Rajčata - Plíseň bramborová - 20 g / 6 l vody - Postřik - červenec, srpen, září

Poznámka: OL=3. Aplikujte podle potřeby v 7 - 14 denních intervalech.

Rajčata - Septorióza - 20 g / 6 l vody - Postřik - červenec, srpen, září

Poznámka: OL=3. Aplikujte podle potřeby v 7 - 14 denních intervalech.

Réva vinná - Plíseň révová - 20 g / 10 l vody - Postřik - červen, červenec

Poznámka: OL=56. Aplikujte před květem a podle potřeby v 7 - 14 denních intervalech.

Růže - Černá skvrnitost - 20 g / 6 l vody - Postřik - červen, červenec, srpen

Poznámka: Aplikujte od května, nejpozději při prvních příznacích choroby. Opakovat podle potřeby v intervalech 7-14 dní, max. 4x.

Rybíz - Antraknóza - 20 g / 10 l vody - Postřik - duben, květen, červen

Poznámka: OL=28. Aplikujte první postřik při odkvétání, další podle potřeby.

Třešeň - Skvrnitost listů - 20 g / 10 l vody - Postřik - květen, červen

Poznámka: OL=28. Aplikujte od konce května, podle potřeby opakovat v 14 denních intervalech.

Tulipány - Houbové choroby - 20 g / 6 l vody - Postřik - květen, červen

Poznámka: Aplikujte preventivně, nejpozději při příznacích choroby, především v závěru vegetace. Opakujte max. 4 x.

Tykvovitá zelenina - Plíseň okurková - 20 g / 6 l vody - Postřik - červen, červenec

Poznámka: OL=7. S jedlou slupkou a melouny. Aplikujte v intervalech 7 - 14 dní. Maximálně 3x za vegetaci.

Višeň - Skvrnitost listů - 20 g / 10 l vody - Postřik - květen, červen

Poznámka: OL=28. Aplikujte od konce května, podle potřeby opakovat v 14 denních intervalech.

Brambor - Hnědá skvrnitost - 20 g / 6 l / 100 m² - Postřik - červen, červenec

Poznámka: OL=7. Aplikujte první postřik dle signalizace. Další v 7 - 14 denních intervalech.

Brambor - Plíseň bramborová - 20 g / 6 l / 100 m² - Postřik - červen, červenec, srpen

Poznámka: OL=7. Aplikujte první postřik dle signalizace. Další v 7 - 14 denních intervalech.

Broskvoň - Kadeřavost listů - 20 g / 10 l vody - Postřik - únor, březen, duben

Poznámka: Při nalévání pupenů. Aplikaci lze opakovat po 14 dnech.