

Harmonie VÁPŇÍK

CZ

HNOJIVO ES

TYP: roztok dusičnanu vápenatého N (Ca; Mg) 8,0 (13,9; 2,5) s borem, mědi, železem, manganem, molybdenem, zinkem.

OBSAH (% m/m)

Celkový dusík (N) 8,0; Dusík dusičnanový(No₃) **8,0;** **Oxid vápenatý** rozpustný ve vodě(CaO) **13,9;** **Oxid hořečnatý** rozpustný ve vodě (MgO) **2,5;** **Bór** rozpustný ve vodě(B) **0,020;** **Měď** rozpustná ve vodě(Cu) **0,030;** v chelátu s EDTA 0,030; **Železo rozpustné** ve vodě (Fe) **0,020** v chelátu s EDTA 0,020; **Mangan** rozpustný ve vodě (Mn) **0,010** v chelátu s EDTA 0,010; **Molybden** rozpustný ve vodě (Mo) **0,001;**

Zinek rozpustný ve vodě (Zn) **0,030** v chelátu s EDTA0,030

Stabilita chelátové frakce – pH 3-7.

Hnojivo dále obsahuje organické kyseliny, podporující lepší příjem mikroprvků.

Vápenaté listové a půdní hnojivo. Bezchlorové koncentrované hnojivo vápníku s dusíkem, hořčíkem a mikroprvky chelátovanými EDTA. **Aplikovaný na listy je nejúčinnějším zdrojem vápníku pro rostliny a ovoce, protože tento prvek se slabě přemísťuje z kořenového systému.** Zlepšuje skladovací podmínky, svěžest a vybarvení plodin a zvyšuje odolnost rostlin proti infekcím houbových chorob. **Má preventivní účinky proti fyziologickým chorobám a poškození ovoce, způsobeným deficitem vápníku jako: hořká skvrnitost, propadnutí, suchá hniloba konců, hnědnutí šupky, hnědnutí okrajů listů, moučnatění, rozpad** a další.

| Plodina | Termíny postřiků | Dávkování | Počet postřiků |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|
| Jabloň | od fáze lískového ořechu, každých 10-14 dnů do 2 týdnů před sběrem Počet postřiků je vhodné přizpůsobit požadavkům odrůdy a předvídanému období skladování. Nižší dávky hnojení používat v raných fázích růstu stromů, vyšší později. | 30-80 ml / 10 l / 100 m ² | 3-6 |
| Ostatní ovocné stromy | od vývinu plodů, každých 7-10 dnů | 30-50 ml / 10 l / 100 m ² | 3-4 |
| Jahoda a ovocné keře | od konce kvetení, každých 7-10 dnů | 30-40 ml / 4 l / 100 m ² | 3 |
| Rajče, paprika, okurka | 2-3 týdny po vysazení od vývinu plodů, každých 5-10 dnů v pařeništích: 50-100 ml na 10 l postřikové kapaliny | 10-30 ml / 4 l / 100 m ² | 3-5 |
| Košťalovitě | 2 týdny po vysazení od vývinu hlávek, každých 2 týdny | 30-50 ml / 4 l / 100 m ² | 3-5 |
| Kořenová, cibulová zelenina aj. | 2-3 týdny od vzklíčení, každých 10-14 dnů | 20-40 ml / 4 l / 100 m ² | 2-3 |
| Okrasné rostliny | ve fázích intenzivního růstu | 10-20 ml / 4 l / 100 m ² | 1-3 |
| Zemědělské kultury | ve fázích intenzivního růstu, každých 10-14 dnů | 10-30 ml / 4 l / 100 m ² | 2-3 |
| Fertigace | 2-10 ml hnojiva na 10 l postřikové kapaliny. Dávky je vhodné přizpůsobit požadavkům plodiny a obsahu vápna v hnojivě. | | |
| Zálivka | 50-100 ml hnojiva na 10 l postřikové kapaliny. Dávky je vhodné přizpůsobit požadavkům plodiny a obsahu vápna v zemině. | | |

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO APLIKACI:

Aplikujte ráno nebo večer při max. teplotě 25°C, min. teplota postřikové kapaliny 10°C. (Při vyšších teplotách vzduchu (zejména kolem poledne při teplejších dnech) by mohlo dojít k popálení rostlin. Pro jednotlivé registrované plodiny (viz. tabulka) postačí aplikovat v uvedených termínech. Je přípustné menší množství usazeniny, dodržujte skladovací podmínky. V případě mísení hnojiva s jiným prostředkem proveďte nejprve zkoušku mísení a zkontrolujte reakci rostliny.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY:

Přímo před postřikem (zálivkou) naplňte nádobu vodou do 2/3 objemu, pak postupně přidávejte hnojivo Harmonie Vápník a vše míchejte. Doplňte vodou do stanoveného objemu a vše zamíchejte. Proveďte postřik (zálivku).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Dodržujte pokyny pro používání. Uchovávejte v původním uzavřeném obalu a mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Chraňte před mrazem.

VÝROBCA: EKOPLON SA Grabki Duże 82 28-225 Szydłów, POLSKO, Tel. +48 41 35-45-169, e-mail: ekoplone@ekoplone.pl, www.ekoplone.pl

BALÍA DODÁVA PRE ČR a SR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštův 192, 747 33 Oldřívov, tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz

BALÍA DODÁVA PRO PRO ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštův 192, 747 33 Oldřívov, tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz

Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu

Harmonie VÁPŇÍK

SK

HNOJIVO ES

TYP: roztok dusičnanu vápenatého N (Ca; Mg) 8,0 (13,9; 2,5) s bórom, meďou, železom, mangánom, molybdénom, zinkom.

OBSAH (% m/m)

Celkový dusík (N) 8,0; Dusík dusičnanový(No₃) **8,0;** **Oxid vápenatý** rozpustný vo vode(CaO) **13,9;** **Oxid horečnatý** rozpustný vo vode (MgO) **2,5;** **Bór** rozpustný vo vode(B) **0,020;** **Meď** rozpustná vo vode(Cu) **0,030;** v cheláte s EDTA 0,030; **Železo rozpustné** vo vode (Fe) **0,020** v cheláte s EDTA 0,020; **Mangán** rozpustný vo vode (Mn) **0,010** v cheláte s EDTA 0,010; **Molybdén** rozpustný vo vode (Mo) **0,001;**

Zinok rozpustný vo vode (Zn) **0,030** v cheláte s EDTA0,030

Stabilita chelátovej frakcie – pH 3-7.

Hnojivo ďalej obsahuje organické kyseliny, podporujúce lepší príjem mikroprvkov.

Vápenaté listové a pôdne hnojivo. Bezchlórové koncentrované hnojivo vápníku s dusíkom, horčíkom a mikroprvkami chelátovanými EDTA. **Aplikovaný na listy je najúčinnějším zdrojom vápníku pre rastliny a ovocie, pretože tento prvok sa slabě přemísťuje z kořenového systému.** Zlepšuje skladovacie podmienky, sviežosť a zafarbenie plodín a zvyšuje odolnosť rastlín proti infekciám hubovitých chorôb. **Má preventívne účinky proti fyziologickým chorobám a poškodeniu ovocia spôsobeným deficitom vápníka ako: škvrnitosť, suchá hniloba koncov, hnednutie šupky, hnednutie okrajov listov, múčnatenie, rozpad** a ďalšie.

| Plodina | Termíny postrekov | Dávkovanie | Počet postřikův |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| Jabloň | od fázy lískového orechu, každých 10-14 dní do 2 týždňov, pred zberom Počet postřikův je vhodné prispôbiť požiadavkám odrôdy a predvídanému obdobiu skladovania. Nižšie dávky hnojenia používať v ranných fázach rastu stromov, vyššie neskôr. | 30-80 ml / 10 l / 100 m ² | 3-6 |
| Ostatné ovocné stromy | od vývinu plodov, každých 7-10 dní | 30-50 ml / 10 l / 100 m ² | 3-4 |
| Jahoda a ovocné kríky | od konca kvitnutia, každých 7-10 dní | 30-40 ml / 4 l / 100 m ² | 3 |
| Paradjka, paprika, uhorka | 2-3 týždne po vysadení od vývinu plodov, každých 5-10 dní v pareniskách: 50-100 ml na 10 l postřikovej kvapaliny | 10-30 ml / 4 l / 100 m ² | 3-5 |
| Hľúbovitě | 2 týždne po vysadení od vývinu hlávok, každé 2 týždne | 30-50 ml / 4 l / 100 m ² | 3-5 |
| Kořenová, cibulová zelenina aj. | 2-3 týždne od vzklíčení, každých 10-14 dní | 20-40 ml / 4 l / 100 m ² | 2-3 |
| Okrasné rastliny | vo fázach intenzívneho rastu | 10-20 ml / 4 l / 100 m ² | 1-3 |
| Polnohosp. kultúry | ve fázach intenzívneho rastu, každých 10-14 dní | 10-30 ml / 4 l / 100 m ² | 2-3 |
| Fertigácia | 2-10 ml hnojiva na 10 l postřikovej kvapaliny. Dávky je vhodné prispôbiť požiadavkám plodiny a obsahu vápna v hnojive. | | |
| Zálievka | 50-100 ml hnojiva na 10 l postřikovej kvapaliny. Dávky je vhodné prispôbiť požiadavkám plodiny a obsahu vápna v zemině. | | |

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNIE PRE APLIKÁCIU:

Aplikujte ráno alebo večer pri max. teplote 25°C, min. teplota postřikovej kvapaliny 10°C. Pri vyšších teplotách vzduchu (hlavne okolo poludnia pri teplejších dňoch) by mohlo dôjsť k popáleniu rastlín. Pre jednotlivé registrované plodiny (viď. Tabuľka) postačí aplikovať v uvedených termínoch. Je prípustné menšie množstvo usadeniny v obale, dodržujte skladovacie podmienky. V prípade zmiešania hnojiva s iným prostriedkom spravte najskôr skúšku a skontrolujte reakciu rastliny.

PŘÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:

Priamo pred postřikom (zálievkou) naplňte nádobu vodou do 2/3 objemu, potom postupne pridávejte hnojivo Harmonie Vápník a miešajte. Doplňte vodou do stanoveného objemu a všetko premiešajte. Spravte postřik (zálievku) a miešajte. Doplňte vodou do stanoveného objemu a všetko premiešajte. Spravte postřik (zálievku).

BEZPEČNOSTNÉ OPATŘENIA:

Dodržujte pokyny pre používanie. Uchovávať v pôvodnom uzavretom obale a mimo dosah detí. Pri požití okamžitě vyhledejte lekársku pomoc. Pri zasažení očí okamžitě dôkladne vypláchnite vodou a vyhledejte lekársku pomoc. Zabraňte uvolneniu do životného prostredia. Hnojivo ani jeho zostatky nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vod. Chraňte pred mrazom.

VÝROBCA: EKOPLON SA Grabki Duże 82 28-225 Szydłów, POLSKO, Tel. +48 41 35-45-169, e-mail: ekoplone@ekoplone.pl, www.ekoplone.pl

BALÍA DODÁVA PRE ČR a SR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštův 192, 747 33 Oldřívov, tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz

Distribútor v SR: AgroBio Opava SK, s.r.o., ul. Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

Datum výroby a číslo šarže: uvedené na obale