

## SPINTOR 6 ml

Přírodní postřikový insekticid s účinnou látkou spinosad ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou určený k ochraně brambor, révy vinné, jablek, kvěťáku, hlávkového zelí, řížíčkové kapusty, brokolice, póru, cibule, papriky a rajčat proti škůdcům. Jako přírodní produkt se spinosad vyznačuje mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, a je tedy šetrný k životnímu prostředí.

### Oblast použití

---

Brambory - Mandelinka bramborová - 1,5 ml / 3-5 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - květen, červen, červenec, srpen

**Poznámka:** OL=7. Aplikujte v době maxima líhnutí larev. Minimální interval mezi aplikacemi je 7 dní.

Brokolice - Můra zelná - 4 ml / 6-8 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - červen, červenec

**Poznámka:** OL=3. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Cibule - Třásněnka zahradní - 4 ml / 6 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - červen, červenec, srpen

**Poznámka:** OL=7. Aplikujte podle signalizace, max. 2x za vegetaci.

Kapusta - Můra zelná - 4 ml / 6-8 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - červen, červenec

**Poznámka:** Kapusta řížíčková. OL=3. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Kvěťák - Můra zelná - 4 ml / 6-8 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - květen, červen

**Poznámka:** OL=3. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Paprika - Třásněnky - 4 ml / 10 l vody - Postřik - červen, červenec, srpen

**Poznámka:** Paprika skleníková. Třásněnka zahradní. OL=3. Aplikujte podle signalizace, max. 2x za vegetaci.

Pór - Třásněnka zahradní - 4 ml / 6 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - červen, červenec, srpen

**Poznámka:** OL=7. Aplikujte podle signalizace, max. 2x za vegetaci.

Rajčata - Třásněnky - 4 ml / 10 l vody - Postřik - červen, červenec, srpen

**Poznámka:** Rajče skleníkové. Třásněnka západní. OL=3. Aplikujte podle signalizace, max. 2x za vegetaci.

Réva vinná - Obaleči - 2-3 ml / 10 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - květen, červenec, srpen

**Poznámka:** OL=14. Aplikujte podle signalizace v době maxima líhnutí larev. Max. 2x za vegetaci.

Zelí - Můra zelná - 4 ml / 6-8 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - červen, červenec

**Poznámka:** Zelí hlávkové. OL=3. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Brokolice - Housenky - 3-4 ml / 6-8 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - červen, červenec

**Poznámka:** OL=3. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Při vyšším výskytu použijte vyšší dávku.

Jabloně - Obaleč jablečný - 6 ml / 10 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - červen, červenec

**Poznámka:** OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Obaleč jablečný, slupkoví a pupenové obaleči.

Kapusta - Housenky - 3-4 ml / 6-8 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - červen, červenec

**Poznámka:** Kapusta růžičková. OL=3. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Při vyšším výskytu použijte vyšší dávku.

Květák - Housenky - 3-4 ml / 6-8 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - květen, červen

**Poznámka:** OL=3. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Při vyšším výskytu použijte vyšší dávku.

Zelí - Housenky - 3-4 ml / 6-8 l / 100 m<sup>2</sup> - Postřik - červen, červenec

**Poznámka:** Zelí hlávkové. OL=3. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Při vyšším výskytu použijte vyšší dávku.