

SULKA EXTRA

Minerální hnojivo pro doplnění konkrétních živin. Patří mezi nejkoncentrovanější zdroje síry v roztokové formě, které je výborně přijatelná rostlinami (část v rychle působící a část v pozvolně působící formě). Je zdrojem draslíku (v bezchloridové a vodorozpustné formě). Obsahuje dusík v rychle působící močovinové formě (neobsahuje dusičnanový-nitrátový dusík). Díky obsahu polysulfidické síry, tak potlačuje výskyt původců houbových chorob (hlavně padlí) a zároveň omezuje výskyt některých živočišných škůdců (hádátka). Obsažený vápník snižuje kyselost půdy, pozitivně ovlivňuje přístupnost stopových prvků a zvyšuje účinnost těchto živin pro rostliny.

Oblast použití

Cibule - Hnojivo minerální - 40 ml / 1 l vody - Moření - březen, duben, září, říjen

Poznámka: Moření sadby. Doporučuje se před výsadbou namáčet po dobu 6–12 hod. v 4 % roztoku, tj. 40 ml v 1 litru vody. Poté ponechte sadbu oschnout s následnou výsadbou.

Cibuloviny - Hnojivo minerální - 1-1,2 l / 100 m² - Zálivka - duben, květen, červen, červenec

Česnek - Hnojivo minerální - 40 ml / 1 l vody - Moření - březen, duben, září, říjen

Poznámka: Moření sadby. Doporučuje se před výsadbou namáčet po dobu 6–12 hod. v 4 % roztoku, tj. 40 ml v 1 litru vody. Poté ponechte sadbu oschnout s následnou výsadbou.

Košťálová zelenina - Hnojivo minerální - 1-1,2 l / 100 m² - Zálivka - duben, květen, červen, červenec

Olejníky - Hnojivo minerální - 0,8-1,3 l / 100 m² - Zálivka - květen, červen, červenec, srpen

Réva vinná - Hnojivo minerální - 40 ml / 1 l vody - Postřik - únor, březen, duben

Poznámka: Přezimující škůdci. Po jarním řezu, před rašením

Ovocné dřeviny - Hnojivo minerální - 10 ml / 1 l vody - Postřik - únor, březen, duben

Poznámka: Přezimující škůdci. Před a při rašení.

Brambor - Hnojivo minerální - 0,5-0,6 l / 100 m² - Zálivka - květen, červen, červenec, srpen

Broskvoň - Hnojivo minerální - 40 ml / 1 l vody - Postřik - leden, únor, březen, duben

Poznámka: Snižuje výskyt kadeřavosti. Před rašením.